



بیمارستان چشم‌پزشکی دکتر خداوost



شالازیون

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کنندگان:

پزشک فوق تخصص پلک و پلاستیک

بازنگری: سال ۱۳۹۹

منبع: بروونر—سودارت ۱۳۹۷

در صورت لزوم چشم خود را با پنبه یا گاز استریل ، با استفاده از آب جوشیده ی ولرم از داخل به خارج پاک کنید.

قبل و بعد از ریختن قطره در چشم دستان خود را بشویید.

طبق دستور پزشک پانسمان را برداشته و دستورات دارویی را اجرا نمایید.

نکات مهم در قطره ریختن:

برای ریختن قطره سر خود را کمی به عقب خم کنید و پلک تحتانی را کمی پایین بکشید

مواظب باشید موقع قطره ریختن نوک قطره چکان با چشم تماس پیدا نکند

روش اصلی درمان در این حالت جراحی شالازیون است.

در برخی افراد شالازیون مکرراً عود می کند. در این حالت لازم است فرد حتماً توسط چشم پزشک ویزیت شود. زیرا اولاً گاهی اوقات بیماری جدی چشمی مثل تومورهای بدخیم به خصوص در افراد بالای ۵۰ سال به صورت شالازیون های مکرر ظاهر می کنند . ثانیاً در برخی موارد بیماری های دیگر چشمی مثل بلفاریت (التهاب لبه پلک) یا مشکلات غدد ترشح کننده چربی لبه پلک باعث ایجاد شالازیون های مکرر می شود . در این حالت کنترل این بیماری ها توسط چشم پزشک به جلوگیری از عود شالازیون کمک می کند.

مراقبت های بعد از عمل

حداقل تا سه روز بعد از عمل از شستشوی صورت خودداری کنید. و پس از آن با نظر پزشک می توانید شستشو را شروع نمایید.



درمان

شالازيون های خيلي کوچک که ظاهر ناخوشائيند
ندارد احتياج به درمان خاصی ندارند و معمولاً به مرور
زمان خودبخود خوب می شوند . شالازيون های بزرگتر
به دو علت اصلی نياز به درمان پیدا می کنند :

اول آنکه شالازيون های بزرگتر ظاهر
ناخوشائيندي دارند و از لحاظ زيبايي مشكل
ساز هستند . ضمن آنکه بهبود خودبخودی آنها
ممکن است چندين ماہ به طول بکشد .

دوم آنکه شالازيون های بزرگتر به خصوص در
پلک بالاي روی قرنيه فشار می آورند و با تغيير
شكل قرنيء باعث ايجاد آستيگماتيسم و تاري
دید می شوند .

پس در اينگونه موارد برای درمان حتماً از پزشك
كمک بگيريد .



استفاده از کمپرس

گرم (روزی ۴-۳ بار ۱۰-۱۵ دقيقه) با استفاده
از حوله تميز و ماساژ ملائم ممکن است به باز
شدن مجرای غده چربی کمک کند و باعث
بهبود سريع تر شالازيون شود .

شالازيون

شالازيون

برجستگي کوچکي در لبه يا نزديك لبه پلک در
زير پوست است که در اثر انسداد مجرای خروجي
غدد ترشح کننده چربی پلک و تجمع مواد ترشح
شده در غده ايجاد می شود . شالازيون ممکن
است در ابتدا ملتهب باشد و باعث ايجاد درد و
قرمزی شود که در اين حالت شبиеه گل مژه است؛
اما پس از مدتی درد و قرمزی فروکش می کند و
توده متورمي در لبه يا ضخامت پلک باقی می
ماند

شالازيون معمولاً مشكل چشمی مهمی ايجاد نمی
کند و پس از چند هفته تا چند ماہ خود به خود
کوچک می شود و از بين می رود .