




بیمارستان چشم‌پزشکی دکتر خدادوست

ناخنک



تهییه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کنندگان:

پزشکان فوق تخصص قرنیه

بازنگری: سال ۱۳۹۹

منبع: بروونر—سودارت ۱۳۹۷

راهنمای مراقبت چشمی

مراقبت های بعد از عمل

- همیشه قبل و بعد از ریختن قطره ها در چشم دستهای خود را بشویید.
- نوک قطره چکان نبایستی با چشم تماس پیدا کند.
- قطره ها را تا زمانی که پزشک توصیه کرده استفاده کنید.



- ۳ تا ۴ روز بعد از عمل جراحی آب به چشم عمل شده نرسد.

- در صورت لزوم چشم را پاک کنید، پلکها را بیندید و بالای آنها را به دستمال کاغذی یا پنبه مرطوب با آب مقطر تمیز کنید.

- استفاده از عینک آفتابی لازم و ضروری است.

روش های درمانی ناخنک دو دسته اند:

- دارو درمانی و جراحی

دارو درمانی

چنانچه ناخنک موجب سوزش شدید و یا قرمزی چشم گردد، پزشک شما با تجویز قطره چشمی و پماد چشمی که حاوی کورتیکواسترویید می باشد، التهاب را کاهش خواهد داد.

جراحی

در موارد شدید از عمل جراحی برداشت ناخنک استفاده می شود.

پیشگیری از ناخنک

استفاده از عینک آفتابی استاندارد، و پوشیدن کلاه مناسب از چشمان خود در برابر آفتاب و باد و گرد و غبار محافظت نمایید.

با آرزوی صحت و سلامتی

علایم این بیماری:

ناخنک لزوما همیشه همراه با علایم نمی باشد؛ و چنانچه علایمی وجود داشته باشد معمولاً خفیف است.

raig ترین علایم :

- قرمزی چشم،
- تاری دید
- درد چشم.

علاوه بر اینها ممکن است فرد دچار سوزش و خارش چشم گردد. چنانچه ناخنک به اندازه‌ای رشد کند که قرنیه را پوشاند، می‌تواند بر بینایی فرد اثر بگذارد. ناخنک ضخیم یا بزرگتر نیز موجب می‌شود احساس کنید یک جسم خارجی در چشم شماست. زمانی که ناخنک ایجاد شود، فرد به دلیل ناراحتی چشم قادر نخواهد بود از لنز‌های تماسی استفاده کند.

درمان:

ناخنک معمولاً تا زمانی که در بینایی فرد مشکلی ایجاد نکند و یا سبب ایجاد درد و ناراحتی شدید در چشم نشود نیازی به درمان ندارد.

این بیماری غالباً در افرادی بروز می‌کند که در مناطق بسیار گرم زندگی می‌کنند و ناچار هستند مدت زمان زیادی را بیرون از خانه و در معرض باد و آفتاب شدید به سر ببرند. به طور کلی می‌توان گفت افرادی که در معرض برخی عوامل قرار بگیرند با احتمال بیشتری به این بیماری مبتلا می‌شوند.



این عوامل عبارتند از:

- نور خورشید
- گرده گلهای و گیاهان
- شن و گرد و خاک
- دود سیگار
- باد

فاکتور‌های دیگری که احتمال ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهد، داشتن پوست روشن و رنگ چشم روشن است.

ناخنک یک ضایعه مثلثی است که از سفیدی چشم (ملتحمه) روی سیاهی چشم کشیده می‌شود. این ضایعه ناشی از رشد خوش خیم بافت پیوندی و رگهای ملتحمه است. ناخنک معمولاً ابتدا به صورت یک سفیدی روی ملتحمه ایجاد می‌شود که به تدریج به سمت مردمک چشم رشد می‌کند.

به علت وجود رگهای زیاد معمولاً رنگ ناخنک صورتی یا قرمز است. ناخنک گاهی ملتهب می‌شود و باعث سوزش و خارش و اشک ریزش می‌شود.

گاهی اوقات ناخنک رشد زیادی می‌کند و تا وسط قرنیه می‌رسد و جلوی دید را می‌گیرد؛ به علاوه حتی ناخنک‌های کوچکتر هم می‌توانند با تغییر شکل قرنیه باعث ایجاد عیوب انکساری شوند و دید افراد را تار کنند.

چه عواملی باعث ایجاد ناخنک می‌شوند؟
دلایل ایجاد ناخنک به طور دقیق مشخص نیست. با

این حال به نظر می‌رسد به مدت طولانی در برابر اشعه ماورای بنفش (UV) قرار گرفتن می‌تواند منجر به رشد ناخنک گردد.